



# Dr. Ramiro Gerardo Villarreal

## PEDIATRA

### Tabla de Vacunación

VACUNA	MESES												AÑOS				
	0	1	2	3	4	6	6	7	9	12	15	18	2	4	6	11/12	14/16
BCG																	
Polio																	
DPTa																	
HIB																	
Hepatitis B																	
Neumococo Conjugada																	
MMR																	
Hepatitis A																	
Varicela																	
Influenza																	

### Observaciones

**DPTa** Se recomienda DPT o DPTa. La vacuna DPTa (acelular) se recomienda sobre la DPT ya que con esta tiene muchos menos efectos colaterales, pero ambas son muy efectivas.

**Hepatitis B** La vacuna de Hepatitis B se puede iniciar desde el nacimiento o al mes de edad. Si se inicia al nacimiento las siguientes vacunaciones serán al mes y a los 6 meses. En la cartilla de vacunación se aplica a los 2, 4 y 6 meses en la Pentavalente.

**Neumococo Conjugada** La vacuna Conjugada de Neumococo (PCV7) se aplica desde los 2 meses. Si el niño tiene más de 15 meses con sólo una dosis es suficiente. Esta vacuna no viene indicada en la cartilla nacional de vacunación (México), pero es muy importante aplicarla.

**Hepatitis A** Inicia la vacunación después del año. Son 2 o tres dosis dependiendo del tipo de vacuna.

**Varicela** Después del año se inicia la vacunación y es una sola dosis.

**Influenza** La vacuna de la influenza se debe de aplicar cada año. Si el niño es menos de 3 años, 2 dosis cada año con diferencia de un mes y de preferencia en Septiembre y Octubre.

**Hepatitis B**  
**Hepatitis A**  
**Varicela** Las vacunas de Hepatitis B, Hepatitis A y Varicela se deben de aplicar cuanto antes después del primer año de edad si es que no se han aplicado antes.

**DPT**  
**HIB**  
**Hepatitis B** En la cartilla de vacunación (México) se aplican a los 2, 4 y 6 meses. Aparece como la vacuna "**Pentavalente**" que corresponde a DPT, HIB y Hepatitis B.